

## Vrai-Faux

### 1<sup>ère</sup> série : transmission du virus

1. Le virus du sida peut se transmettre par les moustiques ?
2. Le virus du sida peut se transmettre par la salive ?
3. Le virus du sida peut se transmettre en serrant la main d'une personne séropositive ?
4. Le mode de transmission du VIH le plus fréquent est le rapport homosexuel ?
5. Les risques de contaminations sont plus importants si on est déjà porteur d'une IST ?

### 2<sup>ème</sup> série : la contamination par le VIH/Sida

1. En France, 15 000 personnes sont porteuses du virus du sida ?
2. Depuis le début de l'épidémie, dans le monde, 10 millions de personnes sont décédées du sida ?
3. Sida signifie Syndrome d'Immuno-Déficience Acquis ?
4. On développe le sida dès que l'on est contaminé ?
5. En France, on ne meurt plus du sida ?

### 3<sup>ème</sup> série : idées reçues sur le VIH/sida 1 :

1. On peut être infecté par le virus du sida en s'asseyant sur la cuvette des WC ?
2. Lors d'une relation sexuelle, le sida ne se transmet pas si la partenaire prend la pilule contraceptive ?
3. On peut avoir confiance en son partenaire s'il n'a pas de signe visible de maladie ?
4. En France, 6 800 personnes ont découvert leur séropositivité en 2004 ?
5. En France, une personne sur dix qui découvre sa séropositivité a moins de 25 ans ?

### 4<sup>ème</sup> série : idées reçues sur le VIH/sida 2 :

1. Il n'existe pas de vaccin contre le sida ?
2. Le VIH est la conséquence de la maladie du sida ?
3. Dans le monde, une personne meurt toutes les minutes ?
4. Dans le monde, une personne est contaminée toutes les 6 secondes ?
5. Plus de 39 millions de personnes sont infectées par le virus du sida dans le monde ?

### 5<sup>ème</sup> série : Dépistage :

1. Le test de dépistage du VIH/Sida est systématiquement fait pendant un don du sang.
2. Le médecin est autorisé à divulguer le résultat d'un test de dépistage du VIH/Sida à une tierce personne.
3. Le test de dépistage du VIH/Sida est payant.
4. 48h après une prise de risque, le résultat du test de dépistage du VIH/Sida est certain.
5. Trois mois après la dernière prise de risque, le résultat d'un test de dépistage du VIH/Sida n'est pas toujours fiable.