

STATISTIQUES MONDIALES SUR LE VIH EN 2017

36,9 millions [31,1 millions - 43,9 millions] de personnes vivaient avec le VIH en 2017.

21,7 millions [19,1 millions - 22,6 millions] de personnes avaient accès à la thérapie antirétrovirale en 2017.

1,8 million [1,4 million - 2,4 millions] de personnes sont devenues nouvellement infectées par le VIH en 2017.

940 000 [670 000 - 1,3 million] de personnes sont décédées de maladies liées au sida en 2017.

77,3 millions [59,9 millions - 100 millions] de personnes ont été infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie.

35,4 millions [25,0 millions - 49,9 millions] de personnes décédées de suite de maladies liées au sida depuis le début de l'épidémie.

Personnes vivant avec le VIH

- En 2017, 36,9 millions [31,1 millions - 43,9 millions] de personnes vivaient avec le VIH.
 - 35,1 millions [29,6 millions - 41,7 millions] d'adultes.
 - 1,8 million [1,3 million - 2,4 millions] d'enfants (< 15 ans).
- 75 % [55 - 92 %] de toutes les personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut VIH en 2017.

Personnes vivant avec le VIH ayant accès à un traitement antirétroviral

- En 2017, 21,7 millions [19,1 millions - 22,6 millions] de personnes vivant avec le VIH avaient accès au traitement antirétroviral, soit une augmentation de 2,3 millions depuis 2016 et de 8 millions [7,1 millions - 8,3 millions] en 2010.
- En 2017, 59 % [44 - 73 %] de toutes les personnes vivant avec le VIH avaient accès au traitement.
 - 59 % [44 - 73 %] des adultes de 15 ans et plus vivant avec le VIH ont eu accès au traitement, tout comme 52 % [37 - 70 %] des enfants de 0 - 14 ans.
- En 2017, 80 % [61 - > 95 %] des femmes enceintes vivant avec le VIH avaient accès à des médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH à leurs bébés.

Nouvelles infections à VIH

- Les nouvelles infections à VIH ont été réduites de 47 % depuis le pic de 1996.
 - En 2017, 1,8 million [1,4 million - 2,4 millions] de personnes étaient nouvellement infectées par le VIH, contre 3,4 millions [2,6 millions - 4,4 millions] en 1996.

- Depuis 2010, les nouvelles infections à VIH chez les adultes ont diminué d'environ 16 %, passant de 1,9 million [1,5 million - 2,5 millions] à 1,6 million [1,3 million - 2,1 millions] en 2017.
- Depuis 2010, les nouvelles infections à VIH chez les enfants ont diminué de 35 %, contre 270 000 [170 000 - 400 000] en 2010 à 180 000 [110 000 - 260 000] en 2017.

Décès liés au sida

- Les décès liés au sida ont été réduits de plus de 51 % depuis le pic de 2004.
- En 2017, 940 000 [670 000 - 1,3 million] de personnes sont décédées de maladies liées au sida dans le monde, contre 1,9 million [1,4 million - 2,7 millions] en 2004 et 1,4 million [1 million - 2 millions] en 2010.

90–90–90

- En 2017, trois personnes sur quatre vivant avec le VIH (75 %) connaissaient leur statut.
- Parmi les personnes qui connaissaient leur statut, quatre sur cinq (79 %) avaient accès au traitement.
- Des personnes qui avaient accès au traitement, quatre sur cinq (81 %) ont vu leur charge virale supprimer.

Femmes

- Chaque semaine, environ 7 000 jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont infectées par le VIH.
- En Afrique subsaharienne, trois nouvelles infections sur quatre touchent les filles âgées de 15 à 19 ans et les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont deux fois plus susceptibles de vivre avec le VIH que les hommes.
- Plus d'un tiers (35 %) des femmes dans le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles à un moment de leur vie.
- Dans certaines régions, les femmes victimes de violence sont une fois et demie plus susceptibles d'être infectées par le VIH.

Populations clés

- Les populations clés et leurs partenaires sexuels représentent:
 - 47 % des nouvelles infections à VIH dans le monde.
 - 95 % des nouvelles infections à VIH en Europe de l'Est et en Asie centrale et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
 - 16 % des nouvelles infections à VIH en Afrique orientale et australe.
- Le risque de contracter le VIH est 27 fois plus élevé chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ; 23 fois plus élevé chez les personnes qui s'injectent des drogues ; 13 fois plus élevé pour les professionnelles du sexe ; 12 fois plus élevé pour les femmes transgenres.

VIH / tuberculose (TB)

- La tuberculose reste la principale cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH.
- La tuberculose est responsable d'environ un décès lié au sida sur trois.

- En 2016, 10,4 millions de personnes ont contracté la tuberculose, dont 1,2 million vivaient avec le VIH.
- Les personnes vivant avec le VIH sans symptômes de tuberculose ont besoin d'un traitement préventif contre la tuberculose. Ce traitement peut avoir pour effet la diminution du risque de développer la tuberculose et la réduction des taux de mortalité par tuberculose / VIH d'environ 40 %.

Investissements

- À la fin de 2017, 21,3 milliards de dollars US étaient disponibles pour la lutte contre le sida dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
- Environ 56 % du total des ressources consacrées au VIH dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire en 2017 provenaient de sources nationales.
- L'ONUSIDA estime que 26,2 milliards de dollars US seront nécessaires pour la riposte au sida en 2020.

Données mondiales sur le VIH

	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personnes vivant avec le VIH	27,4 millions [23,1 millions - 32,6 millions]	30,1 millions [25,4 millions - 35,8 millions]	32,4 millions [27,4 millions - 38,5 millions]	33,7 millions [28,4 millions - 40,0 millions]	34,3 millions [29,0 millions - 40,8 millions]	35,0 millions [29,5 millions - 41,6 millions]	35,6 millions [30,1 millions - 42,4 millions]	36,3 millions [30,6 millions - 43,1 millions]	36,9 millions [31,1 millions - 43,9 millions]
Nouvelles infections à VIH (total)	2,8 millions [2,2 millions - 3,7 millions]	2,5 millions [1,9 million - 3,2 millions]	2,2 millions [1,7 million - 2,9 millions]	2,1 millions [1,6 million - 2,7 millions]	2,0 millions [1,6 million - 2,7 millions]	2,0 millions [1,5 million - 2,6 millions]	1,9 million [1,5 million - 2,5 millions]	1,9 million [1,4 million - 2,4 millions]	1,8 millions [1,4 million - 2,4 millions]
Nouvelles infections à VIH (15 ans et plus)	2,4 millions [1,9 million - 3,2 millions]	2,1 millions [1,6 million - 2,7 millions]	1,9 million [1,5 million - 2,5 millions]	1,8 million [1,4 million - 2,4 millions]	1,8 million [1,4 million - 2,4 millions]	1,8 million [1,4 million - 2,3 millions]	1,7 million [1,3 million - 2,3 millions]	1,7 million [1,3 million - 2,2 millions]	1,6 million [1,3 million - 2,1 millions]
Nouvelles infections à VIH (0 - 14 ans)	420 000 [260 000 - 620 000]	380 000 [240 000 - 560 000]	270 000 [170 000 - 400 000]	230 000 [150 000 - 340 000]	220 000 [140 000 - 320 000]	200 000 [120 000 - 290 000]	190 000 [120 000 - 280 000]	180 000 [110 000 - 270 000]	180 000 [110 000 - 260 000]
Décès liés au sida	1,5 million [1,1 million - 2,2 millions]	1,9 million [1,4 million - 2,7 millions]	1,4 million [1,0 million - 2,0 millions]	1,2 million [880 000 - 1,7 million]	1,2 million [820 000 - 1,6 million]	1,1 million [770 000 - 1,5 million]	1,0 million [730 000 - 1,5 million]	990 000 [700 000 - 1,4 million]	940 000 [670 000 - 1,3 million]
Personnes ayant accès au traitement antirétroviral	611 000 [538 000 - 636 000]	2,1 million [1,8 million - 2,1 millions]	8,0 million [7,1 million - 8,3 millions]	11,4 millions [10,1 million - 11,9 millions]	13,2 million [11,6 million - 13,8 millions]	15,1 million [13,3 million - 15,7 millions]	17,2 million [15,2 million - 17,9 millions]	19,4 millions [17,1 millions - 20,2 millions]	21,7 million [19,1 million - 22,6 millions]
Ressources disponibles pour le VIH (pays à revenu faible ou intermédiaire)	4,8 milliards \$ US*	9,4 milliards \$ US*	15,9 milliards \$ US*	18,8 milliards \$ US*	19,5 milliards \$ US**	19,2 milliards \$ US**	19,0 milliards \$ US**	19,1 milliards \$ US**	21,3 milliards \$ US**

* Y comprises les données sur les pays classés comme pays à revenu faible et intermédiaire selon la classification de la Banque mondiale de 2012.

** Y comprises les données sur les pays classés comme pays à revenu faible et intermédiaire selon la classification de la Banque mondiale de 2013.

Données régionales - 2017

Région	Personnes vivant avec le VIH en 2017	Nouvelles infections à VIH 2017			Décès liés au sida en 2017	Personnes accédant au traitement en 2017
		Total	Âgées de (15 ans et plus)	(Âgées de 0 à 14 ans)		
Afrique de l'Est et du Sud	19,6 millions [17,5 millions - 22,0 millions]	800 000 [650 000 - 1,0 million]	710 000 [580 000 - 890 000]	92 000 [61 000 - 130 000]	380 000 [300 000 - 510 000]	12,9 million [11,4 million - 13,4 millions]
Asie et Pacifique	5,2 millions [4,1 millions - 6,7 millions]	280 000 [210 000 - 390 000]	280 000 [210 000 - 390 000]	10 000 [7 400 - 14 000]	170 000 [110 000 - 280 000]	2,7 million [2,4 million - 2,9 millions]
Afrique de l'Ouest et du Centre	6,1 millions [4,4 millions - 8,1 millions]	370 000 [220 000 - 570 000]	310 000 [180 000 - 470 000]	67 000 [36 000 - 100 000]	280 000 [180 000 - 410 000]	2,4 million [2,1 million - 2,5 millions]
Amérique latine	1,8 millions [1,5 millions - 2,3 millions]	100 000 [77 000 - 130 000]	99 000 [75 000 - 130 000]	2400 [1800 - 3600]	37 000 [26 000 - 51 000]	1,1 million [992 000 - 1,2 million]
Caraïbes	310 000 [260 000 - 420 000]	15 000 [11 000 - 26 000]	14 000 [10 000 - 24 000]	1100 [710 - 1 900]	10 000 [7 100 - 17 000]	181 000 [159 000 - 188 000]
Moyen-Orient et Afrique du Nord	220 000 [150 000 - 300 000]	18 000 [10 000 - 31 000]	17 000 [9 200 - 28 000]	1 300 [780 - 1 900]	9 800 [6 400 - 15 000]	63 200 [55 600 - 65 700]
Europe de l'Est et Asie centrale	1,4 million [1,3 million - 1,6 million]	130 000 [120 000 - 150 000]	130 000 [120 000 - 150 000]	-*	34 000 [25 000 - 41 000]	520 000 [458 000 - 541 000]
Europe occidentale et centrale et Amérique du Nord	2,2 millions [1,9 million - 2,4 millions]	70 000 [57 000 - 84 000]	69 000 [57 000 - 83 000]	-*	13 000 [9 900 - 18 000]	1,7 million [1,5 million - 1,8 million]
Totaux globaux	36,9 millions [31,1 million - 43,9 millions]	1,8 million [1,4 million - 2,4 millions]	1,6 million [1,3 million - 2,1 millions]	180 000 [110 000 - 260 000]	940 000 [670 000 - 1,3 million]	21,7 million [19,1 million - 22,6 millions]

*Aucune estimation n'a été publiée concernant les enfants et ce, en raison du faible nombre de cas.

Couverture régionale du traitement - 2017

	Pourcentage de femmes enceintes qui accèdent aux médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant	Pourcentage d'adultes (15 ans et plus) vivant avec le VIH ayant accès à un traitement antirétroviral	Pourcentage d'enfants (âgés de 0 à 14 ans) vivant avec le VIH ayant accès au traitement antirétroviral	Pourcentage de toutes les personnes vivant avec le VIH ayant accès à un traitement antirétroviral (total)
Afrique de l'Est et du Sud	93% [73->95%]	66% [52-77%]	59% [45-77%]	66% [52->77%]
Asie et Pacifique	56% [43-74%]	53% [37-71%]	71% [53->95%]	53% [37-72%]
Afrique de l'Ouest et du Centre	48% [32-65%]	41% [26-57%]	26% [17-38%]	40% [25-55%]
Amérique latine	73% [58-90%]	61% [43-80%]	55% [39-75%]	61% [43-79%]
Caraïbes	75% [58-95%]	58% [42-80%]	52% [39-80%]	57% [42-80%]
Moyen-Orient et Afrique du Nord	22% [15-32%]	29% [17-43%]	35% [25-47%]	29% [17-43%]
Europe de l'Est et Asie centrale	—*	35% [28-40%]	—*	36% [29-41%]
Europe occidentale et centrale et Amérique du Nord	—*	78% [60-90%]	—	78% [60-90%]
Mondial	80% [61->95%]	59% [44-73%]	52% [37-70%]	59 [44-73%]

*Aucune estimation n'a été publiée concernant les enfants et ce, en raison du faible nombre de cas.

Contact

Communications et plaidoyer mondial | +41 22 791 1697 | communications@unaids.org

Des données supplémentaires sont disponibles sur aidsinfo.unaids.org